

说明书

CELL SPECIFICATION

细胞名称：大鼠肝上皮样干细胞WB-F344

货号：JY480

细胞介绍



项目	详情
种属	大鼠
组织来源	肝脏
生长特征	上皮细胞样； 贴壁生长； 倍增时间：每周 2 至 3 次
培养条件	空气：95%； 二氧化碳：5%； 温度：37℃； 培养箱湿度：70%-80%
冻存条件	无血清冻存液（JY-H040）或90%FBS，DMSO10%（梯度降温）
完全培养基配置	DMEM培养基；10%胎牛血清；1%双抗
传代比例	1:2传代，消化1-2分钟； 0.25%胰蛋白酶（含0.02%EDTA）
细胞培养瓶	建议用T25培养瓶或6cm培养皿
简介	WB-F344 是源于 F344 大鼠正常肝脏的永生肝上皮样干细胞系，兼具祖细胞分化潜能和对致癌物的敏感性，是研究肝脏癌变起始、毒理学损伤及细胞分化的经典模型，为肝脏疾病机制研究提供了重要的体外工具。
保藏机构	JCRB; JCRB0193
产品使用	仅限于科学研究，不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。

细胞检测数据

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
生长特性	贴壁生长	细胞形态	上皮细胞样
细胞密度	80%	细胞活力	>95%
支原体	有口 无☑	细菌	有口 无☑
真菌	有口 无☑	STR	匹配

出库图参考

出库图-1 出库图-2



STR

鉴定结果

鉴达生物科技
GENETIC TESTING BIOTECHNOLOGY

报告编号: Spe 241010D
发布日期: 2024/10/12

检测结果

1) 检测人员: 陈雪坤
2) 检测环境: 温度25℃ 湿度60%RH

样本名称	样本编号	检测项目	检测方法	检测及比对结果
大鼠肝上皮样干细胞WB-F344	Spe 241010D	种属鉴定	SF/T 0136-2023	见表1、图1

表1. 送检样本的Sanger测序结果

样本名称	大鼠肝上皮样干细胞WB-F344
目标区域所在基因	16S rRNA
测序结果 (FASTA格式)	>WBF344-16S-R_B07.ab1 GCACCAATTGGGATGTCCTGATCCAAACATCGAGGTCGTAAACCCTAAT TGTGATATGAACTCTTAAATAGGATTTGGCTGTTATCCCTAGGGTA ACTTGGGCCGTTGATCAATAATTGGGCAATAAGATATTAGTATTAC TTTGAATTTGAGTCTAGGTTAAAAATCATTGGGAGGATTTTTATCTT CCGAGGTCACCCCAACCGAAATTTTTAGTTCATATTTATTTGTTTT AGCCCAATTAGGTTGTTTTATAAAGTTGAAGTAAATTAAGCT CCATAGGGTCTTCTCGTCTTATTTGGGAGATTCACGCTTCTACTGGA AGGTCAAATTCAGTATGAAAGTAAAGAGACAGTTGAACCCCTGTT AGCCATTCATCTAGTCCCTAATTAAGGAACAAGTGAATATGCTACC TTTGACCGTCAAGGATACCGCGGCCGTTTAACTTTAGTCACTGGGCA GGCAATGCCTCTAATACTTGTATGCTAGAGGTGATGTTTT

鉴达生物科技
GENETIC TESTING BIOTECHNOLOGY

报告编号: Spe 241010D
发布日期: 2024/10/12

检测结论

依据Sanger测序和NCBI数据库BLAST比对结果，倾向于支持所检大鼠肝上皮样干细胞WB-F344来源于大鼠 (*Rattus norvegicus*)。

引用瑾原文献参考

Quality control of *Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC. based on value chains and food chain analysis

IF: 13.2

期刊: Scientific Reports

DOI: S41598-023-41013-8

引用产品: 人肺癌细胞A549



文献奖励活动说明

参与资格 凡在2024年7月1日之后发表SCI期刊论文的客户，只要在文中明确标注使用了瑾原生物的产品，即可申请本项奖励。

引用 shanghaijinyuan

贴壁细胞的复苏、传代、冻存步骤

▶ 贴壁细胞复苏: 从液氮罐中或-80℃冰箱中查找到需要复苏的细胞，水浴锅提前打开预热 37℃。

- 1、将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴锅中迅速摇晃解冻;
- 2、加入到含4-6mL完全培养基的离心管中混匀;
- 3、1000rpm离心5min后弃去上清液，使用5ml 完全培养基重悬细胞后接种于 T25 培养瓶中或 6cm 皿中，培养过夜，第二天显微镜下观察细胞生长情况。

▶ 贴壁细胞传代: 如果细胞密度达 80%-90%，即可进行传代培养。

- 1、弃去培养上清液，用不含钙、镁离子的 PBS 润洗细胞1-2 次;
- 2、加入1ml 0.25%含EDTA的胰酶，轻轻晃动培养瓶使之浸润所有细胞，置于37℃培养箱中消化2-3min，然后在显微镜下观察细胞消化情况，若大部分细胞变圆并脱落，迅速拿回操作台，加3ml含10%血清的完全培养基终止消化;
- 3、吸出瓶内所有悬液至离心管1000rpm离心3-5min，离心后去除上清，补加1-2mL完全培养基后吹匀;
- 4、按照1: 2的比例分到新的培养皿中或者培养瓶中，每瓶再补加4ml完全培养基，共5ml。

▶ 贴壁细胞冻存:

- 1、镜下观察细胞密度达到80%-90%即可冻存，一般细胞的推荐冻存密度为 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7$ 个/ml;
- 2、前半部分和传代方式一样，细胞消化离心后去掉上清，用1ml配制好的冻存液重悬细胞;
- 3、将细胞分配到冻存管中，标注好名称、代数、日期等信息;
- 4、如使用的是无血清冻存液可直接放-80℃冰箱过夜后可转入液氮罐中长期保存;

*如使用的是程序冻存液，需要梯度降温法进行处理。

售后无忧——无责售后

如您在使用瑾原产品的过程中，遇到任何问题，都可以随时拨打技术人员电话或添加技术人员微信，我们将在第一时间为您解决。

● 售后服务电话: 180-4986-4459

● 细胞收货操作视频与细胞复苏操作视频



售后服务微信



售后服务QQ



贴壁细胞收货注意事项



细胞复苏步骤



悬浮细胞收货注意事项